

BUSTA ESTRATTA

Flaminio Silvio Scavillo

**DOMANDE CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, IN  
FORMA AGGREGATA ED IN QUALITÀ AZIENDA CAPOFILA, PER LA  
COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 28 POSTI DI  
DIRIGENTE MEDICO - DISCIPLINA ORTOPEDIA E  
TRAUMATOLOGIA - PROVA SCRITTA - BUSTA 1**



- 
- 1) **Per la riduzione delle fratture di gamba la trazione transcheletrica si applica di solito:**
- A attraverso l'astragalo
  - B attraverso la diafisi della tibia
  - C attraverso il calcagno
  - D attraverso la diafisi del perone
- 
- 2) **La terapia chirurgica del piede piatto è solitamente indicata:**
- A prima dei 3 anni
  - B tra i 3 e i 6 anni in caso di piede piatto del 3° grado in su
  - C tra i 9 e i 13 anni
  - D dopo i 16 anni
- 
- 3) **Fra i muscoli della loggia posteriore della coscia:**
- A il semitendinoso è il più laterale
  - B il bicipite ed il semitendinoso convergono sulla tuberosità tibiale
  - C il bicipite femorale è biarticolare
  - D il bicipite è il più mediale
- 
- 4) **Il trattamento di una frattura sottocapitata tipo Garden I in una casalinga di 64 anni rende indicata:**
- A artroprotesi
  - B osteosintesi con viti
  - C endoprotesi
  - D riposo a letto
- 
- 5) **Quale legamento connette la parte mediale del cuneiforme con la base del secondo metatarso:**
- A legamento intermetatarsale
  - B legamento a siepe
  - C legamento di Lisfranc
  - D legamento di Chopart
- 
- 6) **In caso di fratture biossee trasverse dell'avambraccio è importante eseguire una sintesi:**
- A con fili di kirschner
  - B con viti e placche a stabilità relativa
  - C con gesso circolare braccio anti braccio metacarpale
  - D con viti e placche a stabilità assoluta
- 
- 7) **In caso di frattura di Hoffa semplice e a grosso frammento del condilo laterale, l'accesso chirurgico consigliato è:**
- A approccio laterale diretto
  - B approccio postero laterale
  - C approccio pararotuleo mediale
  - D approccio pararotuleo laterale
- 
- 8) **In cosa consiste la frattura di Essex Lopresti:**

- A frattura del terzo distale del radio con lussazione dell'articolazione radio ulnare distale
  - B frattura del radio distale con lussazione volare dell'articolazione radio carpica
  - C frattura della testa radiale con lussazione dell'articolazione radio-ulnare e rottura della membrana interossea
  - D frattura dell'ulna e lussazione del radio
- 

9) **Nelle fratture trimalleolari, il terzo malleolo:**

- A non va mai sintetizzato
  - B se minore del 50% della sua superficie articolare può essere trattato conservativamente
  - C va sintetizzato sempre
  - D va sintetizzato quando il frammento è maggiore del 25% della superficie articolare
- 

10) **Secondo la classificazione di Gustilo per le fratture esposte di gamba:**

- A il grado I prevede una lesione della cute di almeno 5 cm
  - B il damage control delle fratture esposte prevede principalmente l'uso della trazione transcheletrica
  - C nel tipo IIIA è sempre presente un importante danno vascolare
  - D il grado II prevede una lesione della cute > a 1 cm ma senza danno esteso dei tessuti molli
- 

11) **Per frattura lussazione di Monteggia si intende:**

- A frattura dell'omero con lussazione di spalla
  - B frattura epifisi distale del radio e della stiloide ulnare
  - C frattura del radio con lussazione dell'epifisi distale dell'ulna
  - D frattura della diafisi ulnare con lussazione del capitello radiale
- 

12) **Le rotture parziali del tendine di Achille si riscontrano generalmente a seguito di:**

- A piede cavo
  - B tendinosi
  - C piede piatto
  - D fratture malleolari
- 

13) **Il trattamento delle fratture della branca ischio-pubica è:**

- A apparecchio gessato pelvi malleolare per 6 settimane
  - B trazione transcheletrica sovracondiloidea a letto per 6 settimane
  - C riposo al letto per 6 settimane
  - D osteosintesi con viti
- 

14) **La spondilolisi è più frequente:**

- A nei bambini affetti da rachitismo
  - B nelle donne in gravidanza
  - C nelle donne in menopausa
  - D negli atleti sollevatori di pesi
- 

15) **Si definisce pseudoartrosi:**

- A mancata consolidazione di una frattura a distanza di circa 6 mesi dall'evento traumatico
  - B mancata consolidazione di una frattura a distanza di circa 12 mesi dall'evento traumatico
  - C mancata consolidazione di una frattura a distanza di circa 3 mesi dall'evento traumatico
  - D mancata consolidazione di una frattura a distanza di circa 9 mesi dall'evento traumatico
- 

16) **Fra gli agenti patogeni sottoelencati, quale può essere il più indicato a determinare un'artrite settica acuta in un bambino di due anni:**

- A proteus mirabilis
- B haemophilus influenzae
- C escherichia coli
- D streptococco beta emolitico

- 
- 17) **Nella periartrite di spalla il dolore della manovra di abduzione forzata della spalla è significativo per una sofferenza:**
- A del muscolo deltoide
  - B del tendine sottoscapolare
  - C del tendine soprascapolare
  - D della capsula articolare
- 
- 18) **L'apparecchio gessato toraco brachiale può trovare indicazione:**
- A nelle fratture costali
  - B nelle fratture del capitello radiale
  - C nelle fratture della clavicola
  - D nelle fratture dell'omero
- 
- 19) **Una delle complicazioni più frequenti del trattamento in gesso delle fratture della diafisi femorale è:**
- A l'angolazione in varo della frattura
  - B l'angolazione in valgo della frattura
  - C rigidità del ginocchio
  - D ritardo di consolidazione
- 
- 20) **La principale indicazione all'impianto di una protesi totale di gomito è:**
- A instabilità articolare
  - B artrosi
  - C esiti di frattura
  - D artrite reumatoide