

BUSTA NON ESTRATTA

Donatello Selmi

**DOMANDE CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, IN
FORMA AGGREGATA ED IN QUALITÀ AZIENDA CAPOFILA, PER LA
COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 28 POSTI DI
DIRIGENTE MEDICO - DISCIPLINA ORTOPEDIA E
TRAUMATOLOGIA - PROVA SCRITTA - BUSTA 3**



- 1) **Sono tutte indicazioni alla protesi di spalla meno una, quale?**
 - A rottura massiva della cuffia dei rotatori con retrazione tendinea
 - B artrosi primaria gleno-omeroale
 - C lussazione recidivante di spalla
 - D necrosi asettica della testa omerale
- 2) **Quale complicazione può conseguire ad una frattura che costringa un paziente all'immobilità?**
 - A sarcoma dei tessuti molli
 - B coagulazione intravascolare disseminata
 - C necrosi gangrenosa del piede
 - D tromboembolia polmonare
- 3) **Nell'osteoporosi vi è:**
 - A una riduzione della massa ossea
 - B una diminuzione del riassorbimento osseo osteoclastico
 - C una mancata calcificazione della matrice ossea
 - D un'alterazione della forma delle ossa
- 4) **Nelle sindromi radicolari di S1 può essere riscontrata:**
 - A iporeflessia Achillea
 - B deficit estensore proprio alluce
 - C andatura con "steppage"
 - D anestesia "a sella"
- 5) **Un marcato aumento dell'eliminazione urinaria della idrossiprolina può aspettarsi nel:**
 - A acondroplasia
 - B morbo di Paget
 - C osteoporosi
 - D ipoparatiroidismo
- 6) **La correzione incruenta di una scoliosi dopo il termine dell'accrescimento osseo:**
 - A è possibile ma parzialmente
 - B è possibile fino a 30 anni
 - C in alcuni casi selezionati
 - D non è mai possibile
- 7) **Quale delle seguenti classificazioni definisce le calcificazioni eterotopiche dell'anca:**
 - A classificazione Vancouver
 - B classificazione Neer
 - C classificazione di Brooker
 - D classificazione Garden
- 8) **La trasformazione maligna di una esostosi isolata è:**

- A impossibile
 - B molto frequente
 - C molto rara
 - D frequente nelle forme peduncolate
-

9) Il segno di Thompson è patognomonico delle:

- A lesioni del legamento crociato anteriore
 - B fratture del collo femore
 - C rottura del tendine d'Achille
 - D rottura del menisco interno del ginocchio
-

10) Il NIA (nervo interosseo anteriore) è un ramo del:

- A radiale
 - B mediano
 - C ulnare
 - D sciatico
-

11) Il muscolo estensore breve del carpo è innervato da:

- A n.muscolocutaneo
 - B n.mediano
 - C n.ulnare
 - D n.radiale
-

12) Riguardo le fratture del piatto tibiale, una frattura di Schatzker di tipo 4 è caratterizzata da:

- A interessamento del piatto tibiale esterno ed interno senza affossamento
 - B interessamento del solo piatto tibiale interno
 - C interessamento del solo piatto tibiale esterno con affossamento
 - D interessamento della metafisi della tibia
-

13) Quale di queste strutture trasmette le forze dall'avampiede al retropiede durante la fase di carico del passo:

- A nessuna di queste
 - B l'aponeurosi plantare
 - C il tibiale posteriore
 - D i tendini peronieri
-

14) In caso di fratture esposte per quanto tempo è necessario somministrare la terapia antibiotica profilattica:

- A per 5 giorni
 - B per 48 ore
 - C non oltre le 72 ore
 - D per 7 giorni
-

15) In cosa consiste una frattura di tipo Salter Harris tipo 3:

- A una frattura completa della fisi
 - B una frattura della fisi che si estende attraverso l'epifisi
 - C una frattura da compressione della cartilagine di crescita
 - D una frattura della fisi che si estende alle metafisi
-

16) Il trattamento chirurgico delle fratture di capitello radiale è indicato:

- A fratture tipo III e IV
 - B fratture tipo II (scomposizione > 2mm), tipo III e tipo IV
 - C solo nelle fratture lussazioni
 - D sempre
-

- 17) Per una frattura del collo chirurgico del collo chirurgico dell'omero con scomposizione in varo di 20° e perdita di contatto corticale il trattamento indicato è:
- A sostituzione protesica
 - B inchiodamento endomidollare
 - C placca
 - D gesso pendente
-
- 18) Il fenomeno del pivot shift indica:
- A l'andatura tipica degli esiti di poliomielite anteriore acuta
 - B una lombosciatalgia in fase acuta
 - C una paralisi del nervo mediano
 - D un aumento dell'intrarotazione tibiale in esito a lesione del lca
-
- 19) Quale di queste condizioni rappresenta una controindicazione alla terapia con onde d'urto?
- A osteomielite
 - B osteonecrosi
 - C pseudoartrosi
 - D osteoporosi
-
- 20) La classificazione di Pipkin viene comunemente usata per identificare:
- A qualsiasi frattura del bacino associata a lussazione anteriore della testa femorale
 - B il tipo di lussazione dell'articolazione coxo-femorale
 - C il rischio di necrosi asettica nei traumi ad alta energia del bacino
 - D le fratture della testa del femore associate a lussazione posteriore dell'anca e/o a fratture dell'acetabolo