

ESTRATTA *GA* *Q. P. P. P.* *MC*

**DOMANDE CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, IN
FORMA AGGREGATA ED IN QUALITÀ DI AZIENDA CAPOFILA, PER
LA COPERTURA DI N. 60 POSTI A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO DI DIRIGENTE MEDICO - DISCIPLINA
NEUROPSICHIATRIA INFANTILE - PROVA SCRITTA - BUSTA 1**

- 1) **Le Griffiths Mental Development Scales-ER valutano lo sviluppo del bambino:**
- A Da 2 a 4 anni
 - B Da 0 a 2 anni
 - C Da 0 a 8 anni
 - D Da 6 a 8 anni
- 2) **Secondo le linee guida sul trattamento dell'epilessia in età pediatrica a cura della Società italiana di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza (SINPIA) e Azienda Ospedaliera-Universitaria Meyer la sospensione della terapia epilettica è raccomandata:**
- A dopo almeno 1 anno di remissione al fine di ridurre il rischio di ricaduta. La presenza di anomalie elettroencefalografiche parossistiche e di crisi focali sono fattori prognostici sfavorevoli
 - B dopo almeno 2 anni di remissione al fine di ridurre il rischio di ricaduta. La presenza di anomalie elettroencefalografiche parossistiche e di crisi focali sono fattori prognostici sfavorevoli
 - C dopo almeno 3 anni di remissione al fine di ridurre il rischio di ricaduta
 - D dopo almeno 3 anni di remissione al fine di ridurre il rischio di ricaduta. La presenza di anomalie elettroencefalografiche parossistiche e di crisi focali sono fattori prognostici sfavorevoli
- 3) **La Torre di Londra (TOL) è un test che valuta:**
- A Le abilità di decisione strategica e di problem solving in bambini dai 4 ai 13 anni
 - B La capacità di pianificazione e la attenzione sostenuta
 - C L'attenzione selettiva
 - D Le funzioni dell'attenzione selettiva e sostenuta
- 4) **Gli effetti collaterali più frequenti con clozapina sono:**
- A agranulocitosi e pericardite
 - B diplopia e dolori muscolari
 - C linfocitopenia
 - D agranulocitosi e riduzione del sonno
- 5) **Quali dei seguenti non è un criterio per la diagnosi del Disturbo dello Spettro Autistico?**
- A Deficit persistenti della comunicazione sociale e dell'interazione sociale
 - B Allucinazioni uditive e/ o visive di contenuto variabile
 - C Presenza dei sintomi nel periodo precoce di sviluppo
 - D Pattern di comportamento, interessi o attività ristretti e ripetitivi
- 6) **L'indice di Apgar è indicativo di compromissione neurologica:**
- A Se > 7 al 5° minuto
 - B Se < 6 al 10° minuto
 - C Se > 6 al 10° minuto
 - D Se > 7 al 1° minuto
- 7) **Che cosa indica l'acronimo PEP?**
- A Uno strumento usato per la diagnosi di depressione
 - B Profilo Psicoeducativo
 - C Un farmaco
 - D Un servizio del Comune di residenza



- 8) **La sindrome di Prader Willi è una sindrome genetica legata alla:**
- A Duplicazione della regione 15p11-p13 sul cromosoma di origine materna
 - B Delezione/microdelezione della regione 16p11-p17 sul cromosoma di origine paterna
 - C Delezione/microdelezione della regione 15q11-q13 sul cromosoma di origine paterna
 - D Delezione/microdelezione della regione 14q11-q13 sul cromosoma di origine materna
- 9) **La Vineland Adaptive Scale è una scala di valutazione:**
- A Delle funzioni visuo-percettive
 - B Dell'attenzione selettiva
 - C Dello sviluppo adattivo
 - D Delle funzioni esecutive
- 10) **Nel DSM-5-TR si usa la distinzione per:**
- A sesso e genere
 - B genere biologico e genere desiderato
 - C sesso maschile e genere femminile
 - D nessuna distinzione
- 11) **I disturbi dello spettro autistico possono essere associati a patologie. quali tra queste si presenta in percentuale più alta:**
- A Disabilità intellettiva
 - B Sclerosi Tuberosa
 - C Epilessia
 - D Sindrome X fragile
- 12) **Gli strumenti valutativi specifici per la diagnosi di Disturbo dello Spettro Autistico sono:**
- A Questionari autovalutativi
 - B Valutazione logopedica
 - C Valutazione cognitiva
 - D Autism Diagnostic Observation Schedule ADOS2- Autism Diagnostic Interview – Revised ADI-R, valutazione livello cognitivo e del funzionamento adattivo
- 13) **L'intervento cognitivo-comportamentale sull'autocontrollo in età evolutiva viene effettuata in età scolare su minori con:**
- A Disturbo da deficit di attenzione/iperattività
 - B Disabilità Intellettiva
 - C Paralisi Cerebrali Infantili
 - D Disturbo dello Spettro Autistico
- 14) **Quale delle seguenti affermazioni sulla sindrome di West (ws) è vera:**
- A Si tratta di una sindrome epilettica ad esordio nella prima infanzia (3-5 anni) caratterizzata da crisi generalizzate, tracciato EEG tipico (PO a 3 Hz/sec), evoluzione verso una remissione in adolescenza
 - B Si tratta di una sindrome epilettica ad esordio adolescenziale, caratterizzata da crisi focali a partenza dal lobo temporale scatenate dalla prolungata esposizione a videogiochi che determina un progressivo decadimento dei processi di apprendimento
 - C Si tratta di una sindrome epilettica ad esordio entro il primo anno di vita caratterizzata da spasmi spesso in clusters, arresto dello sviluppo psicomotorio, con tracciato EEG tipicamente disorganizzato (Ipsaritmia)
 - D Si tratta di una sindrome epilettica ad esordio entro il primo anno di vita caratterizzata da spasmi spesso in clusters, arresto dello sviluppo psicomotorio ma con tracciato EEG privo di anomalie specifiche
- 15) **Quale delle seguenti affermazioni relative al non suicidal self injury disorder risulta corretta:**

Am

[Handwritten signature]



- A Presenza di danni di entità lieve o moderata direttamente ed intenzionalmente autoinflitti dal soggetto allo scopo di ridurre emozioni negative o risolvere difficoltà interpersonali
- B Vi è intenzionalità suicidaria anche se il comportamento autolesivo non raggiunge esiti fatali
- C E' sempre associato al Disturbo Borderline di Personalità
- D Comprende anche metodiche correlate a rituali religiosi o socialmente accettate (es. scarificazioni rituali, piercing)

16) In quali psicopatologie è di più frequente riscontro l'ingestione di corpo estraneo:

- A Depressione, disturbo narcisistico di personalità
- B Disturbo dell'attaccamento, fobia sociale
- C Psicosi, disabilità intellettiva
- D Disturbo ansioso-fobico

17) Nel Disturbo dello Spettro Autistico e nel Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività, il Teacher-Training è un intervento psicoeducativo rivolto:

- A Ai nonni
- B Ai minori
- C Ai genitori
- D Agli insegnanti

18) Il Modello Early Start Denver Model (ESDM) si rivolge a bambini:

- A In età precoce (0-36 mesi)
- B In età scolare
- C Dai 5 ai 7 anni
- D Dai 4 ai 6 anni

19) Che cosa è la Griffiths-ER?

- A Un PTDA
- B Un questionario autovalutativo per la depressione
- C Uno strumento usato per la diagnosi di psicosi
- D Uno strumento usato per la valutazione dello sviluppo in età evolutiva

20) Il DSM 5 TR nel Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività prevede:

- A La presenza del disturbo in età adulta e una remissione parziale
- B Età di esordio entro i 7 anni
- C La distinzione in 3 sottotipi
- D solo il disturbo in età evolutiva

21) Quale è la fascia di età per effettuare la diagnosi di disturbo da disregolazione dell'umore dirompente nel DSM 5 TR?

- A 7-18 anni
- B 2-18 anni
- C 5-18 anni
- D 6-18 anni

22) In base ai criteri del DSM5 TR viene considerata grave una anoressia nervosa con un BMI (indice di massa corporea) compreso tra:

- A BMI tra 16 e 16,99 kg/m²
- B BMI < 15 kg/m²
- C BMI tra 15 e 15,99 kg/m²
- D BMI ≥ 17 kg/m²

23) Il Disturbo Specifico dell'Apprendimento nel DSM-5 TR comprende:



- A Disturbo di lettura e calcolo, con abilità scolastiche conservate;
- B Disturbo del calcolo, con QI nella norma
- C Disturbo di lettura, difficoltà comprensione del significato di ciò che viene letto, difficoltà nello spelling, difficoltà dell'espressione scritta, difficoltà nel calcolo, difficoltà nel ragionamento aritmetico;
- D Disturbo non specificato;

24) Le stereotipe tipo "hand washing" sono caratteristiche di:

- A ADHD
- B Sindrome di Angelman
- C Sindrome di Gilles de La Tourette
- D Sindrome di Rett

25) Quale indagine neuroradiologica è più indicata nel sospetto di una sindrome neurologica acuta compatibile con vasculite o emorragia intracranica nel bambino:

- A Rx del cranio
- B Ecografia tronco encefalico
- C Angio TAC
- D RMN

26) Diagnosi Disturbo Spettro autismo a che età è possibile:

- A 36-48 mesi
- B 18-36 mesi
- C 3-5 mesi
- D 6-11 mesi

27) I prerequisiti del calcolo si valutano anche attraverso:

- A BIN 4-6-Batteria per la valutazione dell'intelligenza numerica
- B TOL -Torre di Londra
- C VMI-Visual Motor Integration
- D Prove di Sartori

28) Il Progetto Riabilitativo nel Disturbo Ossessivo-compulsivo a grave intensità in età scolare prevede:

- A Trattamento farmacologico associato a terapia cognitivo comportamentale
- B Intervento psicoeducazionale sul minore
- C Intervento di parent-training ai genitori
- D Psicoterapia cognitiva

29) Nel Disturbo da Disregolazione dell'umore Dirompente quale di questi criteri diagnostici non è presente:

- A presenza di condotte vendicative
- B presenza di gravi e ricorrenti scoppi di collera con manifestazioni verbali e o comportamentali
- C nella storia precedente non sono presenti episodi ricorrenti di umore maniaco o ipomaniaco
- D umore intercritico persistentemente irritabile o arrabbiato

30) Quali sono gli strumenti diagnostici (TEST) che andrebbero utilizzati in caso di dubbio di stato mentale a rischio?

- A Prove MT
- B PQ-92- SIPS SOPS
- C GF Social
- D CDI

