

Non estrai da GDF 100

**DOMANDE CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, IN
FORMA AGGREGATA ED IN QUALITÀ DI AZIENDA CAPOFILA, PER
LA COPERTURA DI N. 60 POSTI A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO DI DIRIGENTE MEDICO - DISCIPLINA
NEUROPSICHIATRIA INFANTILE - PROVA SCRITTA - BUSTA 3**

1) Cosa si intende nel DSM 5 TR per Disabilità Intellettiva?

- A La gravità della Disabilità Intellettiva viene data sulla base della compromissione del livello adattivo
- B Un Q.I. inferiore a 70
- C Un Q.I. inferiore a 75
- D La diagnosi di Disabilità intellettiva viene basata solamente sul livello adattivo

2) Il Percorso Diagnostico, Terapeutico, Assistenziale (PDTA)

- A E finalizzato al processo diagnostico
- B Si rivolge all'utenza in età evolutiva
- C Pone le premesse per l'individuazione di un percorso di riferimento definito come "la migliore sequenza temporale e spaziale possibile delle attività da svolgere nel contesto di una determinata situazione organizzativa e di risorse" costituita sulla base delle Linee Guida EBM e del percorso ideale
- D Individua in modo specifico gli interventi riabilitativi

3) Nel DSM 5 TR, i Disturbi del Linguaggio sono inseriti nei:

- A Disturbi Alimentari
- B Disturbi d'Ansia
- C Disturbi della Condotta
- D Disturbi del neurosviluppo

4) Epidemiologia dei disturbi dello spettro autistico:

- A 1 su 1000
- B 1 su 5.000
- C 1 su 100
- D 1 su 68

5) Quale dei seguenti sintomi è caratteristico della malattia di Gilles de la Tourette:

- A Coprolalia
- B Iperfagia
- C Stereotipi
- D Ecolalia

6) Nella prescrizione dei farmaci per l'ADHD è sempre necessario:

- A effettuare un EEG di veglia
- B effettuare un ECG
- C Verificare emocromo
- D monitorare pressione e frequenza cardiaca

7) La distonia è una manifestazione:

- A Piramidale
- B Extrapiramidale
- C Cerebellare
- D Midollare



Am [signature]

- 8) **Quale delle seguenti affermazioni non è valida per l'ADOS-2?**
- A La scala valuta la sintomatologia autistica in età evolutiva, in adolescenza e negli adulti
 - B Lo strumento si basa su un'osservazione comportamentale diretta
 - C L'acronimo sta per Autism Diagnostic Observation Schedule
 - D Lo strumento non richiede un'osservazione comportamentale del paziente
-
- 9) **Il disturbo della Comunicazione sociale (pragmatica) così come definito dal DSM 5 TR si differenzia dal disturbo dello spettro dell'autismo per:**
- A Migliori performance in matematica per i disturbi spettro autismo
 - B pattern di comportamento e interessi ristretti/ripetitivi non presenti nel disturbo comunicazione sociale
 - C Differenze tipiche alla scala PA del MMPI
 - D assenza di discalculia
-
- 10) **Cosa si intende per stato mentale a rischio?**
- A Una condizione che indica un'assoluta presenza di disturbo di personalità
 - B Condizione caratterizzata da sintomatologia negativa ma nessun sintomo positivo
 - C Una condizione caratterizzata da tutti i sintomi presenti nella risposta "a" ma con una pregressa diagnosi di disturbo del neurosviluppo in età evolutiva, in quanto recenti ricerche hanno evidenziato come la presenza di un DSA sia moderatamente correlata a sviluppo di psicosi negli anni successivi
 - D una condizione caratterizzata da modificazioni comportamentali, soprattutto nei termini di riduzione del funzionamento globale del soggetto, associate alla comparsa di sintomi di qualità definibili tuttavia come "sottosoglia", ovvero di frequenza durata e intensità inferiori rispetto ai sintomi psicotici franchi. A completare il quadro, si associa a questi sintomi la presenza di un elevato distress.
-
- 11) **Secondo il codice deontologico medico (2014) il segreto professionale (indicare l'affermazione errata):**
- A Non cessa alla morte dell'assistito
 - B Può essere rivelato se motivato da una giusta causa o dall'adempimento di un obbligo di legge
 - C Va sempre rivelato all'Autorità Giudiziaria in materia di giustizia e sicurezza
 - D Può estendersi ai collaboratori del medico
-
- 12) **Il Parent-Training nei Disturbi del Neurosviluppo viene effettuato su:**
- A Bambino
 - B Istruttori sportivi
 - C Genitori
 - D Insegnanti
-
- 13) **Secondo la legge 170 del 2010 le istituzioni scolastiche devono garantire l'utilizzo di misure dispensative e strumenti compensativi per gli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento; secondo la classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell'organizzazione mondiale della sanità, l'utilizzo adeguato di tali strumenti e misure determina, per l'alunno con DSA una condizione descrivibile come:**
- A Un miglioramento delle capacità
 - B Un miglioramento delle strutture corporee
 - C Un miglioramento delle funzioni corporee
 - D Un miglioramento della performance
-
- 14) **Le pratiche di insegnamento del Modello Early Start Denver Model (ESDM) si riferiscono a principi:**
- A Solo evolutivi
 - B Solo naturalistici
 - C Solo comportamentali
 - D Naturalistici, evolutivi e comportamentali
-
- 15) **Quale esame strumentale è opportuno prescrivere per un bambino con deterioramento cognitivo in età scolare:**

- A Risonanza magnetica nucleare cerebrale
- B Dosaggio plasmatico degli acidi grassi a catena molto lunga
- C Dosaggio degli ossisteroli plasmatici
- D Potenziali evocati visivi

16) I più comuni inibitori selettivi del reuptake della serotonina sono:

- A Fluoxetina, Duloxetina, Sertralina
- B Duloxetina, Mirtazapina, Fluvoxamina
- C Paroxetina, Fluoxetina, Sertralina
- D Venlafaxina, Sertralina, Fluoxetina

17) In caso di terapia con metilfenidato (MPH) il corretto approccio prevede:

- A Utilizzare in associazione i vari tipi di MPH a rilascio prolungato
- B Iniziare con MPH a rilascio immediato ed in seguito, se utile, utilizzare il MPH a rilascio prolungato
- C Iniziare fin da subito con MPH a rilascio prolungato per aumentare la compliance
- D Alternare periodi di terapia con MPH a rilascio immediato ad altri con MPH a rilascio prolungato (Es. durante le vacanze estive è meglio usare il MPH a rilascio prolungato, mentre nel periodo scolastico si usa il MPH a rilascio immediato)

18) Le Scale Psichiatriche per Fanciulli ed Adolescenti (SAFA) sono un questionario:

- A Autosomministrato per la depressione
- B Autosomministrato per i disturbi psicopatologici
- C Autosomministrato per l'ansia
- D Autosomministrato per il disturbo ossessivo-compulsivo

19) Che cosa è l'ADI-R?

- A Un farmaco
- B Uno strumento usato per la diagnosi di psicosi
- C Uno strumento per la diagnosi di depressione
- D L'Autism Diagnostic Interview-Revised (ADI-R) è un'intervista che raccoglie informazioni sui comportamenti importanti per la diagnosi di autismo

20) In base al livello di gravità, quante forme di autismo sono classificate?

- A Cinque forme, di gravità crescente
- B Tre livelli di autismo: Livello 1, Livello 2 e Livello 3
- C Non c'è una classificazione in base alla gravità
- D Due forme, lieve e grave

21) Quale non è un'area di sviluppo compromessa nelle condizioni dello Spettro Autistico?

- A Area relazionale
- B Area comunicativa
- C Area relativa all'attività sportiva
- D Area sociale

22) Secondo le linee di indirizzo per l'emergenza-urgenza psichiatrica in età evolutiva (2018) della Società Italiana di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza (SINPIA) per dimissione sicura si intende:

- A La valutazione dell'assenza di pericolosità sociale del paziente al momento della dimissione ospedaliera
- B L'insieme di azioni che costituiscono il processo di passaggio organizzato di un paziente dal setting di cura ospedaliero a quello territoriale o ad altro setting (ad esempio servizio territoriale, centro diurno terapeutico o comunità terapeutica per adolescenti)
- C La presa in carico del paziente da parte del pediatra di famiglia qualora non siano presenti servizi territoriali di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza
- D La collocazione in strutture di protezione per pazienti oggetto di abusi fisici o sessuali

23) Secondo l'AIFA l'uso del litio:

AM

[Signature]

[Signature]



- A È approvato per età superiore ai 16 anni
- B È approvato per età superiore ai 10 anni
- C Sempre off-label sotto i 17 anni
- D È approvato per età superiore ai 12 anni

24) Il picco d'insorgenza della schizofrenia:

- A E' più precoce nelle donne
- B E' uguale negli uomini e nelle donne
- C E' tra 15 e 25 anni negli uomini
- D E' tra 50 e 60 anni nelle donne

25) Per porre diagnosi di disturbo da deficit di attenzione e iperattività (ADHD) occorre:

- A Analizzare i livelli di escrezione urinaria di dopamina e noradrenalina
- B a. Effettuare sempre una valutazione clinico-strumentale che comprenda EEG, RMN dell'encefalo e test neuropsicologici specifici per tale patologia
- C Effettuare una osservazione accurata del paziente, raccogliere notizie anamnestiche da fonti multiple (famiglia, scuola, allenatori sportivi) anche attraverso l'uso di questionari specifici, utilizzare batterie di test neuropsicologici
- D Utilizzare sempre test proiettivi quali Rorschach, CAT, TAT indispensabili per la diagnosi differenziale con i Disturbi dello Spettro Autistico

26) Il Disturbo dello spettro Autistico è caratterizzato da:

- A Compromissione dell'interazione sociale, della comunicazione con presenza di comportamenti, interessi o attività ristretti e ripetitivi
- B Immaturità emotivo-affettiva
- C Disturbo di linguaggio
- D Disturbo della coordinazione motoria

27) Il "Disturbo da Stress Post-Traumatico" è caratterizzato da tutto quanto segue eccetto:

- A Trasmissione del pensiero
- B Difficoltà di concentrazione
- C Rivivere gli eventi traumatici
- D Arousal eccessivo

28) Quale sottotipo clinico dell'ADHD ha la prognosi peggiore:

- A Combinato
- B Disattentivo
- C Dipende dal tipo di intervento effettuato
- D Iperattivo/Impulsivo

29) Cosa è l'ipsaritmia:

- A Quadro EEG della S di West
- B Un segno ECG
- C Quadro EEG della Lennox-Gastaut
- D Alterazione del ritmo sonno-veglia

30) Il primo a riconoscere e descrivere l'autismo su una rivista medica specializzata è stato:

- A A. Freud
- B A. Rett
- C E. Kraepelin
- D L. Kanner

