


BUSFA NON ESTRATTA Cleavio Perone

**DOMANDE CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA
COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 7 POSTI DI
DIRIGENTE MEDICO - DISCIPLINA PSICHIATRIA - PROVA SCRITTA -
BUSTA 3**



1) **L'empowerment:**

- A È la capacità del sistema sanitario di rispondere alle esigenze della salute mentale
- B E' la capacità del medico di aumentare le proprie competenze
- C E' il potenziamento delle capacità dell'assistenza sanitaria
- D E' fondamentale per la scelta delle cure in un'ottica di recovery

2) **nel DSM 5 TR non è presente per le sostanze la dizione di**

- A Intossicazione
- B Craving
- C Abuso
- D Astinenza

3) **La RTMS ha indicazione in particolare**

- A Nella disforia di genere
- B Nella violenza di genere
- C Nei disturbi dissociativi
- D Nella Depressione e nelle dipendenze

4) **La psicosi di tipo sintetico ha una predominanza di sintomi legati alla**

- A teoria glutammatergica
- B salienza aberrante
- C aumento della serotonina
- D deplezione bloccata della dopamina

5) **la violenza premeditata o predatoria è :**

- A un comportamento avversivo finalizzato al dominio
- B finalizzata ad allontanare la minaccia
- C reattiva
- D affettiva

6) **La classificazione in due tipi distinti di schizofrenia, Tipo I e Tipo II, la si deve al lavoro di :**

- A Callieri
- B Cozza
- C BleuLer
- D Crow

7) **Le variabili per un trattamento psicofarmacologico individualizzato sono:**

- A farmacodinamiche e farmacocinetiche
- B farmacodinamiche
- C epigenetiche
- D farmacogenetica, farmacogenomiche, epigenetiche e legate allo stile di vita

8) **Gli interventi psicosociali integrati nelle Severe Mental Illness sono erogati :**

- A in modalità sequenziale e con outcome definiti
- B in associazione alle terapie psicofarmacologiche e coordinati da un case manager
- C su discrezione del clinico per le persone con SMI

D in sostituzione delle terapie psicofarmacologiche

9) Una reazione avversa che occorre ad un paziente in trattamento farmacologico

- A va segnalata all'AIFA nel più breve tempo possibile
- B Deve essere segnalata all'AIFA entro 48 ore
- C va segnalata all' AIFA solo se esiste una correlazione con il farmaco somministrato
- D può essere segnalata all'AIFA solo la reazione non è riportata in scheda tecnica

10) Il dosaggio della Clozapina

- A va aumentato in caso di utilizzo di farmaci inibitori del citocromo CYP450 1A2
- B Va raddoppiato in caso di utilizzo concomitante di inibitori del citocromo CYP450 3A4
- C va aumentato in caso di utilizzo di antiipertensivi
- D va ridotto in caso di utilizzo di farmaci inibitori del citocromo CYP450 1A2

11) Secondo il DSM 5 tr l'anosognosia corrisponde a una condizione nella quale un individuo..

- A Secondo il DSM 5 l'Anosognosia corrisponde a una condizione nella quale un individuo con una malattia sembra inconsapevole dell'esistenza della malattia stessa.
- B Secondo il DSM 5 l'Anosognosia corrisponde a una condizione nella quale la persona sviluppa comportamenti che mettono l'individuo in contrasto con le altre persone, tra cui un esagerato senso della propria importanza e una concomitante aspettativa di essere trattati in modo speciale, così come un'insensibile mancanza di empatia verso gli altri, che comprende sia l'inconsapevolezza degli altrui bisogni sia la tendenza a usare gli altri in funzione del proprio vantaggio.
- C Secondo il DSM 5 l'Anosognosia corrisponde a una condizione nella quale la persona sviluppa l'incapacità di trarre godimento dalle / impegnarsi nelle / trovare l'energia per le esperienze della vita; deficit nella capacità di provare piacere o interesse per le cose.
- D Nel DSM 5 l'Anosognosia è l'incapacità di ricordare importanti informazioni autobiografiche, secondo modalità non coerenti con la comune dimenticanza.

12) La depressione post partum, è ritenuta inquadrabile nell'ambito:

- A Psicosi Schizofrenica
- B depressione reattiva all'evento
- C Quadri clinici medici-endocrinologici
- D Psicosi Affettive

13) Le tecniche di tranquillizzazione rapida sconsigliano l'uso di farmaci antipsicotici in pazienti:

- A in pazienti schizofrenici catatonici
- B sconosciuti senza anamnesi
- C in pazienti che già assumono terapia antipsicotica
- D in pazienti con disturbo bipolare in fase di eccitamento maniaco

14) Quali sono i criteri indicati dal DSM 5 per la diagnosi del Disturbo bipolare I?

- A Per la diagnosi di disturbo bipolare I, è necessario soddisfare i criteri per un episodio maniaco. L'episodio maniaco può essere preceduto e può essere seguito da episodi ipomaniacali o depressivi maggiori.
- B Per la diagnosi di disturbo bipolare I è necessario la comorbidità con un disturbo da uso di sostanze e un attuale o pregresso episodio ipomaniaco
- C La presenza di un disturbo di personalità istrionico
- D Per la diagnosi di disturbo bipolare I è necessario un attuale o pregresso episodio ipomaniaco e i seguenti criteri per un attuale o pregresso episodio depressivo

15) La sindrome metabolica è più frequente con l'utilizzo di:

- A Antipsicotici Atipici
- B Antipsicotici Tipici
- C Antidepressivi SSRI
- D Antidepressivi Triciclici

16) Nel Disturbo Bipolare, il rischio di suicidio è circa

- A 6 volte maggiore di quello della popolazione generale
- B 10 volte maggiore di quello della popolazione generale
- C 20 volte maggiore di quello della popolazione generale
- D 15 volte maggiore di quello della popolazione generale



17) Quali fra le seguenti forme di demenza sono primarie?

- A Demenza vascolare
- B Demenza Fronto-Temporale
- C Demenza di Pick
- D Alzheimer

18) La terapia Electroconvulsivante

- A E' indicata in molte patologie psichiatriche come l'ansia e gli attacchi di panico
- B E' indicata nella depressione resistente, la sindrome neurolettica maligna, la catatonìa
- C È vietata dalla legge
- D Si può fare solo se ordinata dal sindaco

19) Quali delle seguenti affermazioni in merito al TSO è vera?

- A viene proposto dal Sindaco ed eseguito dai Vigili urbani
- B viene proposto solo da uno psichiatra e convalidato da un medico del SSN
- C viene ordinato dal Sindaco ed eseguito dai vigili urbani
- D viene proposto da un medico del SSN e convalidato dal giudice tutelare

20) Quale dei seguenti argomenti non fa parte dei gruppi trasversali di esperti per il DSM5 TR

- A Problemi legati al sesso e al genere
- B suicidio
- C Problemi legati alla cultura
- D Problemi legati alle guerre

21) La recovery:

- A si ottiene con la psicoeducazione
- B riguarda la stabilità farmacoterapica
- C attiene al raggiungimento di una vita piena e soddisfacente per il paziente
- D attiene esclusivamente alla soddisfazione di bisogni sociali

22) Il Trattamento Sanitario Obbligatorio, secondo la legge 833/1978

- A deve essere convalidato entro 48 ore dall'ordinanza sindacale dal giudice tutelare
- B non può essere praticato in REMS in quanto la misura di sicurezza prevede la obbligatorietà del trattamento
- C è disposto da qualunque medico del SSN
- D è disposto dal magistrato di sorveglianza

23) Quale sostanza d'abuso è antagonista dei recettori NMDA (N-methyl-D-aspartate)?

- A Salvinorina A
- B Metadone
- C Ketamina
- D Etanolo

24) Il dosaggio dell'acamprosato è

- A 666 mg tre volte al giorno > 60 kg
- B 666 mg due volte die se paziente di sesso femminile
- C 666 mg tre volte al giorno < 60 kg
- D 333 mg due volte al giorno < 60 kg

25) **Quale dei seguenti non è un trattamento Evidence based per il trattamento del disturbo borderline di personalità**

- A Terapia Dialettico comportamentale
- B Terapia basata sulla mentalizzazione
- C EMDR
- D Transfert focused therapy



26) **Il soggetto valutato socialmente pericoloso può:**

- A Essere assegnato ad una sezione per minorati psichici (Art. 98 dpr 431/78)
- B Essere affidato al DSM
- C Essere posto agli arresti domiciliari
- D Essere inviato in SPDC per la verifica pericolosità

27) **La cartella clinica (segnare la risposta sbagliata):**

- A può essere redatta dal medico e dall'infermiere
- B un atto pubblico di fede privilegiata
- C deve essere compilata con chiarezza, tempestività, veridicità e precisione
- D può essere rilasciata dal reparto di degenza a richiesta dell'interessato

28) **Nel Disturbo Bipolare, l'uso di cannabinoidi:**

- A posticipa l'età di esordio ed aumenta il rischio suicidario
- B anticipa l'età di esordio ed aumenta il rischio suicidario
- C non incide sull'esito
- D ritarda l'età di esordio

29) **Che cos'è un Centro di salute mentale (CSM)**

- A Si tratta di un ambulatorio psichiatrico il cui accesso è solo su indicazione ospedaliera
- B Il Centro di salute mentale (CSM) è la sede organizzativa dell'équipe degli operatori e la sede del coordinamento degli interventi di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale, nel territorio di competenza, tramite anche l'integrazione funzionale con le attività dei distretti.
- C IL CSM è una struttura del terzo settore
- D IL CSM è un ubicato nel contesto di Aziende ospedaliere, o di presidi ospedalieri di Aziende U.S.L., o di Policlinici Universitari. E' parte integrante del Dipartimento di Salute Mentale, anche quando l'ospedale in cui è ubicato non sia amministrato dall'Azienda sanitaria di cui il DSM fa parte

30) **Il dosaggio della lamotrigina**

- A Va aumentato in caso di uso concomitante di valproato
- B Va raddoppiato in caso di uso concomitante di valproato
- C Va raddoppiato in caso di uso concomitante di carbamazepina
- D Va dimezzato in caso di uso concomitante di carbamazepina