

DOMANDE CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 16 POSTI DI DIRIGENTE MEDICO - DISCIPLINA RADIODIAGNOSTICA, PER LE SOLE ESIGENZE DELL'ASL ROMA 5 - PROVA SCRITTA - BUSTA 3

-
- 1) **La più alta incidenza di reazione avverse acute alla somministrazione di mezzo di contrasto si registra**
- A con mezzi di contrasto a base di gadolinio
 - B con mezzi di contrasto ecografici
 - C con mezzi di contrasto a base di iodio
 - D con mezzi di contrasto a base di gadolinio e iodio
-
- 2) **Un tumore ovarico esteso a una o entrambe le ovaie o le tube con estensione al peritoneo extra-pelvico e/o ai linfonodi retroperitoneali è un tumore di stadio (sec. FIGO):**
- A Stadio II
 - B Stadio I
 - C Stadio III
 - D Stadio IV
-
- 3) **Un' opacità mammaria a margini regolari in donna di 50 anni, di primo riscontro:**
- A È sicuramente benigna perché ha margini regolari
 - B è probabilmente benigna ma necessita di integrazione con esame ecografico
 - C È probabilmente benigna ma richiede una rivalutazione a breve distanza
 - D È sicuramente benigna perché di primo riscontro
-
- 4) **Nella classificazione TNM relativa al carcinoma polmonare lo stadio T3 è definito in caso di**
- A presenza di noduli satelliti nel medesimo lobo della lesione primitiva
 - B a+b+c
 - C lesione primitiva di diametro maggiore di 5 cm e fino a 7 cm
 - D infiltrazione della pleura parietale
-
- 5) **Indicazioni alla biopsia mammaria sotto guida ecografica**
- A Lesione margini irregolari con maggior asse verticale solo se di dimensioni maggiori al cm
 - B Lesione margini regolari di nuova insorgenza indipendentemente dalle dimensioni
 - C Lesione a margini irregolari con maggior asse verticale solo se di dimensioni inferiori al cm
 - D Lesione a margini irregolari indipendentemente dalle dimensioni
-
- 6) **Nell'ambito della stadiazione TNM per i carcinomi delle ghiandole salivari maggiori la lesione discariocinetica primitiva è definita come T3 nel caso di**
- A un tumore di diametro superiore a 4 centimetri
 - B un tumore di diametro massimo compreso tra 2 e 4 centimetri senza estensione extraparenchimale
 - C b+c
 - D un tumore con estensione a livello del basicranio
-
- 7) **Le microcalcificazioni a morfologia duttale alla mammografia:**
- A Sono sicuramente benigne
 - B Sono sicuramente maligne
 - C sono probabilmente maligne e si richiede prelievo stereotassico
 - D Sono probabilmente benigne ma si consiglia prelievo stereotassico
-
- 8) **La tecnica di Ecklund è**

- A Una proiezione radiografica dopo somministrazione per bolo di mdc
- B Una proiezione radiografica per lo studio delle anche del neonato
- C una proiezione radiografica per la esclusione degli elementi protesici in mammografia
- D Una proiezione radiografica per la valutazione del dente dell'epistrotico

9) Dopo un'ablazione epatica con RF si può osservare una sindrome post-ablazione più comunemente caratterizzata da

- A Sindrome simil-influenzale che si manifesta a circa 15 giorni dalla procedura
- B Febbre molto elevata e malessere molto intenso, spesso ematemesi massiva
- C Nessuna delle precedenti
- D Nausea e malessere di modesta entità a risoluzione spontanea

10) Nell' "Ichikado CT scoring" ,utilizzato per come sistema per predire la mortalità a breve termine dei Pazienti con ARDS sottoposti a TC del torace, non rientrano nel calcolo del punteggio:

- A le alterazioni parenchimali "a favo d'api"
- B le quote di versamento pleurico
- C le aree parenchimali polmonari di ground-glass
- D le aree parenchimali polmonari a normale attenuazione

11) In caso di esecuzione di due esami in elezione con iniezione di mezzo di contrasto a base di iodio in Pazienti con funzionalità renale gravemente compromessa (eGFR < 30 ml/min/1.73m²), quale intervallo di tempo dovrebbe trascorrere tra le due indagini?

- A almeno 6 ore
- B almeno 48 ore
- C almeno 24 ore
- D almeno 12 ore

12) Lo studio delle protesi mammarie:

- A Può essere eseguito solo con risonanza magnetica
- B Può essere eseguito con risonanza magnetica solo dopo somministrazione ev di mdc
- C Può essere eseguito con risonanza magnetica senza somministrazione ev di mdc
- D Non può essere eseguito in mammografia

13) la malattia di Paget

- A è una patologia mammaria e si manifesta con secrezione lattescente
- B è una patologia mammaria che si manifesta con dermatite del solco sottomammario
- C è una patologia mammaria e si manifesta con prurito incoercibile al capezzolo
- D non è una patologia mammaria


14) Come viene denominata una frattura da avulsione del margine laterale del piatto tibiale?

- A frattura di Bennett
- B frattura di Segond;
- C frattura di Hangman
- D frattura di Colles

15) Nella necessità di sottoporre un Paziente a uno studio TC con mezzo di contrasto e a uno studio RM con mezzo di contrasto, quale delle seguenti affermazioni è errata

- A poiché i mezzi di contrasto a base di gadolinio attenuano bene i raggi X, per evitare difficoltà interpretative, in caso di studio addominale la TC con mdc
- B nei Pazienti con funzionalità renale gravemente compromessa (eGFR <30 ml/min/1.73m²) dovrebbe esserci un intervallo di almeno 7 giorni tra i due esami
- C nei Pazienti con funzionalità renale normale o moderatamente compromessa (eGFR >30 ml/min/1.73m²) dovrebbe esserci un intervallo di almeno 4 ore tra i due esami
- D a prescindere dalla funzionalità renale del Paziente, è necessario un intervallo di almeno 24 ore tra i due esami

- 16) **Quale dei seguenti è un fattore di rischio per danno renale acuto dopo somministrazione di mezzo di contrasto a base di iodio per via endovenosa**
- A eGFR<35 ml/min/1.73m² del Paziente
 - B eGFR<30 ml/min/1.73m² del Paziente
 - C eGFR<45 ml/min/1.73m² del Paziente
 - D eGFR>30 ml/min/1.73m² del Paziente
-
- 17) **Segno di dissecazione aortica alla TC torace è:**
- A Palla sign
 - B Beak sign
 - C Fleischner sign
 - D Westermark sign
-
- 18) **Con quale metodica si stabilisce lo score ASPECTS?**
- A nessuna delle precedenti
 - B TC perfusionale
 - C angio-TC trifasica;
 - D TC basale
-
- 19) **La ginecomastia:**
- A può essere legata all'abuso di alcool
 - B può essere legata all'assunzione di farmaci
 - C è sempre bilaterale
 - D è patologica solo se bilaterale
-
- 20) **Nell'ambito della stadiazione per i carcinomi anali, sono considerate metastasi a distanza anziché linfadenopatie secondarie loco-regionali**
- A le linfadenopatie secondarie otturatorie
 - B le linfadenopatie secondarie inguinali
 - C le linfadenopatie secondarie paraortiche e quelle lungo i vasi iliaci comuni
 - D le linfadenopatie secondarie iliache esterne
-
- 21) **Secondo la classificazione AAST, a quale grado corrisponde una lacerazione del diaframma > 10 cm?**
- A grado II
 - B grado V
 - C grado IV
 - D grado III
-
- 22) **Nell'ambito delle stazioni linfonodali cervicali la stazione VIII di riferisce a linfonodi**
- A sottomentonieri
 - B intraparotidei
 - C giugulo-digastrici
 - D sovraclaveari
-
- 23) **Quale valore dell'angolo di Böhler è suggestivo di frattura del calcagno?**
- A < 20 gradi
 - B tra 20 gradi e 40 gradi
 - C nessuna delle precedenti
 - D > 50 gradi
-
- 24) **Per classificare le lussazioni acromion-claveari, si usa la classificazione di:**
- A Fischer
 - B Garden
 - C Neer
 - D Rockwood



25) **La TC perfusionale cerebrale:**

- A tutte le precedenti
- B serve a stimare la penombra ischemica e il core ischemico
- C risente molto degli artefatti da movimento
- D necessità una velocità di flusso iniettivo di m.d.c. adeguatamente elevata

26) **Possibile complicanza della nefrostomia è:**

- A Ostruzione del catetere
- B Dislocazione del catetere
- C Urinoma
- D Tutte le precedenti

27) **Una reazione avversa acuta alla somministrazione di un mezzo di contrasto si manifesta:**

- A entro 12 ore dalla somministrazione
- B entro 15 minuti dalla somministrazione
- C entro 60 minuti dalla somministrazione
- D entro 30 minuti dalla somministrazione

28) **Tra le arterie splancniche quella che più frequentemente presenta aneurisma è:**

- A Arteria epatica
- B Arteria gastrica sinistra
- C Arteria gastroduodenale
- D Arteria splenica

29) **Il tumore filloide:**

- A È un tumore benigno tipico dell'età avanzata
- B È un tumore benigno tipico dell'età giovanile
- C È un tumore maligno ad alta aggressività
- D È un tumore maligno comune in gravidanza

30) **La principale indicazione per l'utilizzo della RM encefalo in urgenza**

- A emorragia cerebrale
- B ictus al risveglio
- C ictus cronico
- D tutte le precedenti

