

# Vaccinazione in gravidanza

## Quali vaccinazioni si possono fare durante la gravidanza?

Nel corso della gravidanza sono raccomandate **le vaccinazioni contro difterite, tetano, pertosse (dTpa)**. La vaccinazione dTpa è da effettuare ad ogni gravidanza, anche se la donna sia già stata vaccinata o sia in regola con i richiami decennali o abbia avuto la pertosse. Infatti, la pertosse contratta dal neonato nei primi mesi di vita può essere molto grave o persino mortale e la fonte di infezione è frequentemente la madre. Il vaccino dTpa si è dimostrato sicuro sia per la donna in gravidanza sia per il feto. Le donne che si trovano in stato di gravidanza durante la stagione epidemica è opportuno che vengano vaccinate anche **contro l'influenza** per l'aumentato rischio di complicanze gravi e di decesso correlati alla malattia. L'influenza stagionale aumenta il rischio di ospedalizzazione materna, prematurità, parto cesareo, di stress fetale, basso peso alla nascita e interruzione della gravidanza. Nei neonati al di sotto dei 6 mesi di vita, per cui non esiste ancora un vaccino, l'influenza aumenta il rischio di malattia severa e complicanze. La vaccinazione della mamma protegge il neonato attraverso il passaggio di anticorpi protettivi tramite la placenta.

## Controindicazioni alla vaccinazione

Ipersensibilità grave (precedente reazione anafilattica) ai principi attivi o a uno qualunque degli eccipienti elencati a qualunque componente presente in tracce come uova, (ovoalbumina, proteine del pollo). La vaccinazione deve essere rimandata in caso di malattia febbrile moderata o grave od malattia acuta.

## Quando vaccinarsi?

Il periodo raccomandato per effettuare la vaccinazione anti Difterite-Tetano-Pertosse è dalla 27a alla 36a settimana di gestazione, idealmente intorno alla 28a settimana, al fine di consentire alla gestante la produzione di anticorpi sufficienti e il conseguente passaggio transplacentare. La vaccinazione, con vaccino inattivato anti influenzale, può essere effettuata in qualsiasi trimestre della gravidanza, in quanto sembra non associata ad effetti avversi nel prodotto del concepimento. Set di dati più estesi sulla sicurezza sono disponibili per il secondo e terzo trimestre, rispetto al primo comunque, le raccomandazioni delle autorità sanitarie internazionali (ECDC, OMS) indicano la vaccinazione delle donne in gravidanza a prescindere dal trimestre. Il vaccino anti influenzale stagionale può essere somministrata anche insieme al vaccino anti difterite - tetano - pertosse (dTpa).

È consigliata la somministrazione dei medesimi vaccini al partner e a eventuali conviventi.



Tutto quello  
che c'è da  
sapere

## Vaccinazioni controindicate in gravidanza

Il vaccini contro MPR e varicella, contenendo vaccini a virus vivi attenuati, non possono essere somministrati in gravidanza, sebbene l'effettuazione accidentale della vaccinazione in donne che non sapevano di essere in gravidanza non ha mai fatto registrare un aumento di aborti o malformazioni. È opportuno informare le donne che intendono programmare una gravidanza circa la necessità di posticiparla di un mese dopo la vaccinazione. L'esposizione accidentale della donna in gravidanza alla vaccinazione o l'inizio di una gravidanza entro le quattro settimane successive alla vaccinazione non rappresentano indicazioni all'interruzione volontaria di gravidanza. Nel caso una donna non risulti immune, dovrebbe essere vaccinata durante il puerperio. Anche la vaccinazione anti-HPV non è attualmente consigliata durante la gravidanza, poiché non sono stati effettuati studi specifici sull'impiego del vaccino in donne gravide. L'eventuale somministrazione accidentale in gravidanza non comporta comunque l'indicazione all'interruzione volontaria della stessa, mentre la vaccinazione dovrà essere sospesa e le successive dosi rimandate sino al completamento della gravidanza.

### CAVE (Palestrina)

Presidio Sanitario: Via Morino snc - 00033 Cave (RM)  
Prenotazione telefonica: 06 953 226 00 - Lunedì e Mercoledì 9:00 - 12:00  
Prenotazione tramite mail: [vaccinazioniadulti.cave@aslroma5.it](mailto:vaccinazioniadulti.cave@aslroma5.it)

### COLLEFERRO

Prenotazione telefonica: 06 972 067 51/53 dal Lunedì al Venerdì 9:00 - 12:00  
Prenotazione e-mail: [prenotazionevaccinazioni.colleferro@aslroma5.it](mailto:prenotazionevaccinazioni.colleferro@aslroma5.it)

### GUIDONIA

Distretto Sanitario: Via dei Castagni 20/22 - 00012 Guidonia (RM) - Piano terra - Stanza 12  
Prenotazione telefonica: 0774 779 123 - Martedì 10:00 - 13:00  
Prenotazione tramite mail: [vaccinazioniadulti.guidonia@aslroma5.it](mailto:vaccinazioniadulti.guidonia@aslroma5.it)

### MONTEROTONDO / MENTANA

Presidio Sanitario: Via Reatina s.n.c (angolo via E. Fermi) - 00013 Mentana (RM)  
Prenotazione: 06 900 751 70 - Martedì: telefonicamente 12:30 - 13:30 / personalmente 10:00 - 12:00  
Accesso diretto: Giovedì 8:00 - 13:00 esclusivamente previa prenotazione

### OLEVANO ROMANO (Subiaco)

Presidio Sanitario: Via San Francesco d'Assisi snc - 00035 Olevano Romano (RM)  
Prenotazione telefonica: 06 956 41 86 / 06 956 22 07 / 0774 811 53 77 - Giovedì e Venerdì 11:00 - 12:30

### TIVOLI

Distretto Sanitario: P.zza Massimo 1 - 00019 Tivoli (RM)  
Prenotazione telefonica: 0774 704 713 - dal Lunedì al Venerdì 10:30 - 13:00  
Ambulatorio: Mercoledì, Giovedì e Venerdì 8:30 - 12:00

Per gli utenti interessati a viaggiare all'estero l'unico centro vaccinale abilitato per la vaccinazione per la febbre gialla è quello situato a Colleferro.